

福井県におけるギンムクドリ *Sturnus sericeus* の初観察記録

出口 翔大*¹

Shota DEGUCHI*¹. 2012. The first record of the Red-billed Staling in Fukui prefecture in 2012. *Ciconia* (Bulletin of Fukui Nature Conservation Center) 17:23-24. A Red-billed Staling *Sturnus sericeus* was observed at a paddy field in Mikuni town, Sakai city, Fukui prefecture on 30 April, 2012. This was the first record of this species in Fukui prefecture.

下したが、その後再確認することはできなかった。

はじめに

ギンムクドリ *Sturnus sericeus* は、中国南東部に留鳥として生息し、冬には一部がベトナム北部で越冬する (Brazil and Nurney 2009 ; Robson and Allen 2005)。日本には稀な冬鳥、旅鳥として渡来する。1972年に沖縄県与那国島に渡来したものが初記録とされ、1990年頃からは南西諸島を中心に毎年観察されるようになった。近年は北海道から九州までの全国各地で記録があり、やや増加傾向にある (叶内ほか 1998 ; 高野 2007)。

福井県において、ムクドリ科はムクドリ *S. cinereus*、コムクドリ *S. philippensis*、ホシムクドリ *S. vulgaris* の3種がこれまでに観察されているが、本種の観察記録はない (福井県自然環境保全調査研究会鳥獣部会 1998)。

2012年4月30日に福井県坂井市三国町沖野々の水田で、本種の雌個体を1羽確認したので報告する。

観察した行動

ギンムクドリ雌は2012年4月30日、福井県坂井市三国町沖野々の水田地帯 (136°14' E, 36°17' N) において1羽で確認された。地面から飛び立ち、付近のらっきょう畑に植わっているクロマツの枝 (高さ約5.5m) に止まったところを14時10分に観察した。枝上では体の向きを変える、羽づくろいをする行動などが見られた。一瞬見失うが、14時24分には直前までムクドリが止まっていた1~2m先の枯れ木に移動していた。この際ムクドリを追い払ったと思われ、ムクドリの鳴き声より通る「ピュルピュル」という鳴き声が聞かれた。間もなくクロマツの背後のらっきょう畑の方に降

形態

体のサイズはムクドリとほぼ同大で、体型はややスマートな印象を受けた。頭・下面は灰色みがかった黄褐色で、喉から胸にかけて白みを帯び、胸は褐色みが強かった。後頸には黒色の縦斑があり、上面・肩羽は特に濃い茶褐色で腰は淡色、風切羽は金属光沢のある濃紫色であった。頭には茶褐色の顎線が認められ、嘴は赤橙色で先端は黒色、橙黄色の脚が印象的であった (図1,2)。また、飛翔時に本種の特徴である風切羽の基部が白いことを確認できた。

考察

本種は渡りの時期に石川県輪島市舳倉島や滋賀県大津市、旧湖北町 (平田 2009) など近隣の県でも記録があり、本県で観察されても不思議ではない。本種の分布域は北上の過程にあると考えられており、今後、季節を問わず日本各地で本種の観察記録が増加すると示唆されている (平田 2009)。本県においても同様のことが言えると思われる。この個体は、これ以降観察されなかったことから渡りの際に迷行し、一時的に本観察地に立ち寄った可能性が示唆される。

本種が観察された九頭竜川下流域の水田地帯は、多くのシギ・チドリ類によって春季の渡りの途中に利用され (柳町 2006)、本種も農耕地など開けた環境を好むため、今回観察された環境は適したものであったと思われる。今後、渡り鳥に休息地や餌場を提供する意味でも、水田地帯などの広大な湿地環境を保全していく必要がある。

* 連絡・別刷請求先 (Corresponding author) E-mail: sd.exit21@gmail.com

¹ 〒918-8026 福井県坂井市淵1-1001 Fuchi 1-1001, Fukui City, Fukui 918-8026, Japan.



図1 ギンムクドリ♀ 正面



図2 ギンムクドリ♀ 横

引用文献

Brazil, M., Nurney, D. 2009. Birds of East Asia: China, Taiwan, Korea, Japan, and Russia. Princeton University Press, Princeton.

福井県自然環境保全調査研究会鳥獣部会(編). 1998. 福井の鳥とけものたち. 福井県県民生活部自然保護課, 福井市.

平田和彦. 2009. 滋賀県高島市における積雪期のギンムクドリ *Sturnus sericeus* の記録. 日本鳥学会誌 59: 61-64.

叶内拓哉・安部直哉・上田秀雄. 1998. 日本の野鳥(山溪ハンディ図鑑 7). 山と溪谷社, 東京.

Robson, C., Allen, R. 2005. New Holland field guide to the birds of South-East Asia. New Holland Publishers, London.

高野伸二. 2007. フィールドガイド日本の野鳥 増補改訂版(財)日本野鳥の会, 東京.

柳町邦光. 2006. ヘラサギ *Platalea leucorodia* 2006年福井県で初記録. *Ciconia*(福井県自然保護センター研究報告)11:26-27.