

Ciconia (福井県自然保護センター研究報告) 4:41-43 (1995)

1994年福井市で落鳥した シロハラミズナギドリ

大迫義人¹

シロハラミズナギドリ *Pterodroma hypoleuca* は、小笠原諸島、硫黄諸島、西部ハワイ諸島で繁殖し、付近の海域に生息している（清棲 1978, Harrison 1983）。日本では主に太平洋側での確認記録が多いが（例えば千葉県 1975, 愛知県 1983, 宮林 1985, 桑原 1990），少数例ながら日本海側での記録もある（例えば新潟県 1987, 富山県野鳥保護の会 1989）。福井県では、1959年、1979年（福井県 1982）と未発表ながら1993年に（田辺哲也 私信）記録されているだけの迷鳥である。1994年10月に本種を福井市内で確認したので報告する。柴田獣医科病院の柴田晴夫氏は、この個体を保護し、死亡までの経緯を報告して下さった。記して感謝する。

1994年10月1日、福井県福井市大畠町蹄ノ滝（36°3'N, 136°17'30"E, 標高64m）で、段ボール箱に入った状態で本個体が発見され保護された。翌日までは生存していたが、10月3日には衰弱のため死亡した。9月29日、紀伊半島から上陸した台風26号が、発見された前日の早朝、福井県を通過したことより、この台風によって運ばれ、福井市に落下したものと考えられる。発見された時点ですでに第3者に保護されていたが、落下日から発見日までに1日しかなかったと予想されるため、大きな移動は無かったものと考えられる。

本個体の腹部は白く翼下面にM字形の黒帯を有し、前頭は暗石盤色で灰色でなく、額は白かった（写真1, 2）。また、翼開長73.0cm, 翼長23.7cm, 尾長11.7cm, 露出嘴峰長2.3cm, 距長3.1cmであったことより、本個体はシロハラミズナギドリと同定された（清棲 1978, Harrison 1983）。ただし、体重は120gしかなく、数日間絶食していたと考えられる。

なお、この個体は、福井県自然保護センターに剥製標本として保存された。

1. 福井県自然保護センター. 〒912-01 福井県大野市南六呂師169-11-2




写真1. 1994年10月1日に、福井県福井市大畠町蹄ノ滝で保護されたシロハラミズナギドリの頭胸部。

Photo 1. Head and breast of a Bonin Petrel protected near Hizumenotaki Fall, Ohata Town, Fukui City on 1 October, 1994.




写真2. 1994年10月1日に、福井県福井市大畠町蹄ノ滝で保護されたシロハラミズナギドリの下面。

Photo 2. Underpart of a Bonin Petrel protected near Hizumenotaki Fall, Ohata Town, Fukui City on 1 October, 1994.

引用文献

- 愛知県. 1983. 愛知の野鳥. 332pp. 愛知県.
- 千葉県. 1975. 千葉県鳥類目録. 134pp. 千葉県.
- 福井県. 1982. 福井県の鳥獣. 240pp. 福井県.
- Harrison, P. 1983. Seabirds: an identification guide. 448pp. Houghton Mifflin Company, Boston.
- 清棲幸保. 1978. 増補改訂版日本鳥類大図鑑. 1,002pp. 講談社, 東京.
- 桑原和之. 1990. 千葉県からのシロハラミズナギドリ類 *Pterodroma* spp. の迷行例について. 日本鳥類標識協会誌 5:44-45.
- 宮林泰彦. 東京港野鳥公園でのシロハラミズナギドリ *Pterodroma hypoleuca* の死体発見. Strix 4: 69-70.
- 新潟県. 1987. 越佐の鳥をたずねて. 104pp. 新潟県.
- 富山県野鳥保護の会編. 1989. 富山県の鳥類－自然環境管理計画策定のための調査－. 104pp. 富山県.

A record of the Bonin Petrel in Fukui City, 1994

Yoshito Ohsako¹

One Bonin Petrel *Pterodroma hypoleuca* was protected at Ohata Town ($36^{\circ} 3'N$, $136^{\circ} 17' 30"E$, Elev. 64m), Fukui City on 1 October, 1994. The typhoon that passed through one day before the bird was found, possibly introduced it to Fukui City. The bird was stuffed and preserved at Fukui Nature Conservation Center.

1. Fukui Nature Conservation Center. Minamirokuroshi 169-11-2, Ono-shi, Fukui 912-01

